

第三章 复变函数的积分

- ① 复变函数积分的概念
- ② 柯西-古萨定理和复合闭路定理
- ③ 柯西积分公式
- ④ 解析函数与调和函数的关系

第一节 复变函数积分的概念

- 复变函数积分的定义
- 参变量法计算复变函数积分
- 长大不等式和大小圆弧引理

设 C 是平面上一条光滑或逐段光滑的连续曲线, 也就是说它的参数方程 $z = z(t), a \leq t \leq b$ 除去有限个点之外都有非零导数. 这里 $z'(t) = x'(t) + iy'(t)$.

固定它的一个方向, 称为**正方向**, 则我们得到一条**有向曲线**. 和这条曲线方向相反的记作 C^- , 它的方向被称为该曲线**负方向**.

对于闭路, 它的**正方向总是指逆时针方向**, 负方向总是指顺时针方向. 以后我们不加说明的话**默认是正方向**.

所谓的复变函数积分, 本质上仍然是第二类曲线积分. 设复变函数

$$w = f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y)$$

定义在区域 D 内, 有向曲线 C 包含在 D 中. 形式地展开

$$f(z) \, dz = (u + iv)(dx + i \, dy) = (u \, dx - v \, dy) + i(u \, dy + v \, dx).$$

定义. 若下述右侧两个线积分均存在, 则定义


$$\int_C f(z) \, dz = \int_C (u \, dx - v \, dy) + i \int_C (v \, dx + u \, dy)$$

为 $f(z)$ 沿曲线 C 的积分.

当然, 我们也可以像线积分那样通过分割来定义. 在曲线 C 上依次选择分点 $z_0 = A, z_1, \dots, z_{n-1}, z_n = B$. 然后在每一段弧上任取 $\zeta_k \in \overbrace{z_{k-1} z_k}$ 并作和式

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k, \quad \Delta z_k = z_k - z_{k-1}.$$

然后称 $n \rightarrow \infty$, 分割的最大弧长 $\rightarrow 0$ 时 S_n 的极限为复变函数积分. 这二者是等价的.



若 C 是闭路, 则该积分记为 $\oint_C f(z) dz$. 此时该积分不依赖端点的选取.

若 C 是实轴上的区间 $[a, b]$ 且 $f(z) = u(x)$, 则

$$\int_C f(z) \, dz = \int_a^b f(z) \, dz = \int_a^b u(x) \, dx$$

就是黎曼积分.

根据线积分的存在性条件可知:

定理. 若 $f(z)$ 在 D 内连续, C 是光滑曲线, 则 $\int_C f(z) dz$ 总存在.

线积分中诸如变量替换等技巧可以照搬过来使用. 设

$$C : z(t) = x(t) + \mathrm{i}y(t), \quad a \leq t \leq b$$

是一条光滑有向曲线, 且正方向为 t 增加的方向, 则 $dz = z'(t) dt = [x'(t) + iy'(t)] dt$.

积分计算方法 I: 参变量法.

$$\int_C f(z) \, dz = \int_a^b f[z(t)] z'(t) \, dt.$$

若 C 的正方向是从 $z(b)$ 到 $z(a)$, 则需要交换右侧积分的上下限.


若 C 是逐段光滑的, 则相应的积分就是各段的积分之和. 以后我们只考虑逐段光滑曲线上的连续函数的积分.

典型例题：计算复变函数沿曲线的积分

例. 求 $\int_C z \, dz$, 其中 C 是从原点到点 $3+4i$ 的直线段.

解. 由于 $z = (3 + 4i)t, 0 \leq t \leq 1$, 因此

$$\begin{aligned}\int_C z \, dz &= \int_0^1 (3 + 4i)t \cdot (3 + 4i) \, dt \\ &= (3 + 4i)^2 \int_0^1 t \, dt \\ &= \frac{1}{2}(3 + 4i)^2 = -\frac{7}{2} + 12i.\end{aligned}$$




典型例题：计算复变函数沿曲线的积分

例. 求 $\int_C z \, dz$, 其中 C 是抛物线 $y = \frac{4}{9}x^2$ 上从原点到点 $3 + 4i$ 的曲线段.

解. 由于 $z = t + \frac{4}{9}it^2, 0 \leq t \leq 3$, 因此

$$\begin{aligned}\int_C z \, dz &= \int_0^3 \left(t + \frac{4}{9}it^2 \right) \cdot \left(1 + \frac{8}{9}it \right) dt \\ &= \int_0^3 \left(t + \frac{4}{3}it^2 - \frac{32}{81}t^3 \right) dt \\ &= \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{4}{9}it^3 - \frac{8}{81}t^4 \right) \Big|_0^3 = -\frac{7}{2} + 12i.\end{aligned}$$




典型例题：计算复变函数沿曲线的积分

例. 求 $\int_C \operatorname{Re} z \, dz$, 其中 C 是从原点到点 $1+i$ 的直线段.

解. 由于 $z = (1 + i)t, 0 \leq t \leq 1$, 因此 $\operatorname{Re} z = t$,

$$\begin{aligned}\int_C \operatorname{Re} z \, dz &= \int_0^1 t \cdot (1 + i) \, dt \\ &= (1 + i) \int_0^1 t \, dt = \frac{1 + i}{2}.\end{aligned}$$




典型例题：计算复变函数沿曲线的积分

例. 求 $\int_C \operatorname{Re} z \, dz$, 其中 C 是从原点到点 i 再到 $1+i$ 的折线段.

解. 第一段 $z = it, 0 \leq t \leq 1, \operatorname{Re} z = 0$, 第二段 $z = t + i, 0 \leq t \leq 1, \operatorname{Re} z = t$. 因此


$$\int_C \operatorname{Re} z \, dz = \int_0^1 t \, dt = \frac{1}{2}.$$



典型例题：计算复变函数沿曲线的积分

可以看出, 即便起点和终点相同, 沿不同路径 $f(z) = \operatorname{Re} z$ 的积分也可能不同. 而 $f(z) = z$ 的积分则只和起点和终点位置有关, 与路径无关. 原因在于 $f(z) = z$ 是处处解析的, 我们会在下一节解释为何如此.

练习. 求 $\int_C \operatorname{Im} z \, dz = \underline{-\frac{1}{2} + \frac{i}{2}}$, 其中 C 是从原点沿 $y = x$ 到点 $1 + i$ 再到 i 的折线段.



例题：计算复变函数沿圆周的积分

例. 求 $\oint_{|z-z_0|=r} (z-z_0)^{n+1} dz$, 其中 n 为整数.

解. $C: |z - z_0| = r$ 的参数方程为 $z = z_0 + re^{i\theta}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$. 于是 $dz = ire^{i\theta} d\theta$.

$$\oint_C (z - z_0)^n \mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} \mathrm{i}(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})^{n+1} \mathrm{d}\theta = \mathrm{i}r^{n+1} \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+1)\theta} \mathrm{d}\theta$$
$$= \mathrm{i}r^{n+1} \int_0^{2\pi} [\cos((n+1)\theta) + \mathrm{i}\sin((n+1)\theta)] \mathrm{d}\theta = \begin{cases} 2\pi\mathrm{i}, & \text{若 } n = -1; \\ 0, & \text{若 } n \neq -1. \end{cases}$$

这个积分以后经常用到, 它的特点是积分值与圆周的圆心和半径都无关.

定理 (线性性质).

$$(1) \int_C f(z) \, dz = - \int_{C^-} f(z) \, dz.$$

$$(2) \int_C k f(z) dz = k \int_C f(z) dz.$$

$$(3) \int_C [f(z) \pm g(z)] dz = \int_C f(z) dz \pm \int_C g(z) dz.$$

长大不等式. 设有向曲线 C 的长度为 L , $f(z)$ 在 C 上满足 $|f(z)| \leq M$, 则

$$\left| \int_C f(z) \, dz \right| \leq \int_C |f(z)| \, ds \leq ML.$$

证明. 对

$$\left| \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |f(\zeta_k)| \Delta z_k \leq \sum_{k=1}^n |f(\zeta_k)| \Delta s_k \leq M \sum_{k=1}^n \Delta s_k$$

取极限即可.

长大不等式常常用于证明等式: 估算一个积分和一个具体的数值之差不超过任意给定的 ε , 从而得到二者相等.

注意到: 若被积函数 $f(z)$ 在 C 上的点都连续, 那么 $|f(z)|$ 是 C 的参变量 $t \in [a, b]$ 的连续函数, 从而有界, 即存在 M 使得 $|f(z)| \leq M, \forall z \in C$.

有

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} f(z) \, dz = ik(\theta_2 - \theta_1).$$

类似地, 若 $\lim_{z \rightarrow \infty} zf(z) = k$, 则有大圆弧引理.

$$C_R : z = Re^{i\theta}, \quad \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2,$$
$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) \, dz = ik(\theta_2 - \theta_1).$$

上述结论中实际上只需要 $f(z)$ 在 $\theta_1 \leq \text{Arg } z \leq \theta_2$ 范围内的极限满足相应条件即可. 此外, 实际应用中遇到的常常是 $k = 0$ 的情形.

第二节 柯西-古萨定理和复合闭路定理


- 柯西-古萨定理
- 复合闭路定理和连续变形定理
- 原函数和不定积分

观察下方的两条曲线 C_1, C_2 . 设 $C = C_1^- + C_2$. 可以看出

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz \iff \oint_C f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz - \int_{C_1} f(z) dz = 0.$$

所以 $f(z)$ 的积分只与起点终点有关 $\iff f(z)$ 绕任意闭路的积分为零.

这里, 若闭合曲线 C 不是闭路 (有自相交的点), 也可以拆分为一些闭路的并.



上一节中我们计算了 $f(z) = z, \operatorname{Re} z, \frac{1}{z - z_0}$ 的积分. 其中

- $f(z) = z$ 处处解析, 积分只与起点终点有关 (闭路积分为零);
- $f(z) = \frac{1}{z - z_0}$ 有奇点 z_0 , 沿绕 z_0 闭路的积分非零;
- $f(z) = \operatorname{Re} z$ 处处不解析, 积分与路径有关 (闭路积分可能非零).

由此可见函数沿闭路积分为零, 与函数在闭路内部是否解析有关.

设 C 是一条闭路, D 是其内部区域. 设 $f(z)$ 在闭区域 $\bar{D} = D \cup C$ 上解析, 即存在区域 $B \supseteq \bar{D}$ 使得 $f(z)$ 在 B 上解析.

为了简便假设 $f'(z)$ 连续, 则

$$\begin{aligned} \oint_C f(z) \, dz &= \oint_C (u \, dx - v \, dy) + i \oint_C (v \, dx + u \, dy) \\ &\stackrel{\text{格林公式}}{=} - \iint_D (v_x + u_y) \, dx \, dy + i \iint_D (u_x - v_y) \, dx \, dy \\ &\stackrel{\text{C-R 方程}}{=} 0. \end{aligned}$$

也可以从

$$\oint_C f(z) \, dz = - \int_D \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \, dz \, d\bar{z} = 0$$

看出.

柯西-古萨定理. 设 $f(z)$ 在闭路 C 上连续, C 内部解析, 则 $\oint_C f(z) dz = 0$.

推论. 设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, C 是 D 内一条闭合曲线, 则 $\oint_C f(z) dz = 0$.

这里的闭合曲线可以不是闭路.

例题：柯西-古萨定理计算积分

例. 求 $\oint_{|z|=1} \frac{1}{2z-3} dz$.

解. 由于 $\frac{1}{2z-3}$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 因此由柯西-古萨定理

$$\oint_{|z|=1} \frac{1}{2z-3} dz = 0.$$

练习.

$$(1) \oint_{|z-2|=1} \frac{1}{z^2+z} dz = \underline{0}.$$

$$(2) \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{|z|} dz = \underline{0}.$$

例题：柯西-古萨定理计算积分

例. 求 $\oint_C \frac{1}{z(z^2+1)} dz$, 其中 $C: |z-i| = \frac{1}{2}$.

解. 注意到

$$\frac{1}{z(z^2 + 1)} = \frac{1}{z} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z + i} + \frac{1}{z - i} \right).$$

由于 $\frac{1}{z}, \frac{1}{z+i}$ 在 $|z-i| \leq \frac{1}{2}$ 上解析, 因此由柯西-古萨定理

$$\oint_C \frac{1}{z} dz = \oint_C \frac{1}{z + i} dz = 0,$$


$$\oint_C \frac{1}{z(z^2 + 1)} dz = -\frac{1}{2} \oint_C \frac{1}{z - i} dz = -\pi i.$$

复合闭路围成的区域

设 $C_0, C_1, \dots, C_n$ 是 $n+1$ 条闭路, $C_1, \dots, C_n$ 每一条都包含在其它闭路的外部, 而且它们都包含在 C_0 的内部. 这样它们围成了一个多连通区域 D , 它的边界称为一个**复合闭路**

$$C = C_0 + C_1^- + \cdots + C_n^-.$$

沿着 C 前进的点, D 总在它的左侧, 所以这就是它的正方向.




复合闭路定理. 设 $f(z)$ 在复合闭路 $C = C_0 + C_1^- + \cdots + C_n^-$ 及其所围成的多连通区域内解析, 则

$$\oint_{C_0} f(z) \, dz = \oint_{C_1} f(z) \, dz + \cdots + \oint_{C_n} f(z) \, dz.$$


事实上, 复合闭路定理和柯西-古萨定理可以看成是一个定理的两种情形: 设 C 是一个闭路或复合闭路, 若 $f(z)$ 在 C 及其围成的区域 (单连通或多连通) 内解析, 则

$$\oint_C f(z) \, dz = 0.$$

在实际应用中, 若被积函数 $f(z)$ 在 (复合) 闭路 C 的内部有有限多个奇点 $z_1, \dots, z_k$. 那么我们可以在 C 内部 (围成的区域) 构造闭路 $C_1, \dots, C_k$, 使得每个 C_j 内部只包含一个奇点 z_j . 这样, 内部含多个奇点的情形就可以化成内部只含一个奇点的情形. 最后将这些闭路上的积分相加即可.



此外, 从复合闭路定理还可以看出, 在计算积分 $\oint_C f(z) dz$ 时, C 的具体形状无关紧要, 只要其内部奇点不变, C 可以任意变形. 因为我们总可以选择一个包含这些奇点的闭路 C' , 使得 C' 包含在 C 及其变形后的闭路内部. 这样它们的积分自然都和 C' 上的积分相同. 这里即使 C 是复合闭路也是可以自由变形的.




复合闭路定理

证明. 以曲线 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n+1}$ 把 $C_0, C_1, \dots, C_n$ 连接起来, 则它们把区域 D 分成了两个单连通区域 D_1, D_2 . 对 D_1 和 D_2 的边界应用柯西-古萨定理并相加, 则 γ_i 对应的部分正好相互抵消, 因此

$$\oint_{C_0} f(z) \, dz - \oint_{C_1} f(z) \, dz - \cdots - \oint_{C_n} f(z) \, dz = 0.$$

于是定理得证.



例题：复合闭路定理的应用

例. 证明对于任意闭路 C , $\oint_C (z-a)^n dz = 0$, 其中 $n \neq -1$ 为整数, $a \notin C$.

证明.

(1) 若 a 不在 C 的内部, 则 $(z-a)^n$ 在 C 及其内部解析. 由柯西-古萨定理,

$$\oint_C (z - a)^n \, dz = 0.$$

(2) 若 a 在 C 的内部, 则在 C 的内部取一个以 a 为圆心的圆周 C_1 . 由复合闭路定理以及上一节的结论

$$\oint_C (z - a)^n dz = \oint_{C_1} (z - a)^n dz = 0.$$



例题：复合闭路定理的应用


同理, 由复合闭路定理和上一节的结论可知当 a 在 C 的内部且 $n = -1$ 时积分为 $2\pi i$.

定理. 当 a 在 C 的内部时,

$$\oint_C (z - a)^n dz = \begin{cases} 2\pi i, & n = -1; \\ 0, & n \neq -1. \end{cases}$$

例题：复合闭路定理的应用

例. 求 $\oint_{\Gamma} \frac{2z-1}{z^2-z} dz$, 其中 Γ 是由 $2 \pm i, -2 \pm i$ 形成的矩形闭路.




解. 函数 $\frac{2z-1}{z^2-z}$ 在 Γ 内有两个奇点 $z=0, 1$. 设 C_1, C_2 如图所示, 由复合闭路定理

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \frac{2z-1}{z^2-z} dz &= \oint_{C_1} \frac{2z-1}{z^2-z} dz + \oint_{C_2} \frac{2z-1}{z^2-z} dz \\ &= \oint_{C_1} \frac{1}{z} dz + \oint_{C_1} \frac{1}{z-1} dz + \oint_{C_2} \frac{1}{z} dz + \oint_{C_2} \frac{1}{z-1} dz \\ &= 2\pi i + 0 + 0 + 2\pi i = 4\pi i. \end{aligned}$$

例题：复合闭路定理的应用

例. 求 $\oint_{\Gamma} \frac{e^z}{z} dz$, 其中 $\Gamma = C_1 + C_2^-$, $C_1: |z| = 2, C_2: |z| = 1$.



解. 函数 $\frac{e^z}{z}$ 在 C_1, C_2 围城的圆环域内解析. 由复合闭路定理可知 $\oint_{\Gamma} \frac{e^z}{z} dz = 0$.

$$\oint_C f(z) dz = \begin{cases} 0, & \text{若 } n - m \geq 2, \\ 2\pi ia/b, & \text{若 } n - m = 1, \end{cases}$$

其中 a, b 分别是 $p(z), q(z)$ 的最高次项系数.

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = \begin{cases} 0, & \text{若 } n - m \geq 2, \\ a/b, & \text{若 } n - m = 1, \end{cases}$$
$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \oint_{C_R} f(z) dz = \begin{cases} 0, & \text{若 } n - m \geq 2, \\ 2\pi i a/b, & \text{若 } n - m = 1. \end{cases}$$
$$\oint_C f(z) \, dz = \oint_{C_B} f(z) \, dz$$

9

例题: 有理函数绕闭路积分

注意闭路 C 内部必须包含 $f(z)$ 的所有奇点上述结论方可成立. 若 $m \geq n$, 则我们可将 $f(z)$ 写成一个多项式和上述形式有理函数之和.

练习. $\oint_{|z|=2} \frac{z^2}{(2z+1)(z^2+1)} dz = \underline{\pi i}.$

设有向曲线 $C: z = z(t), a \leq t \leq b$ 起于 $z_1 = z(a)$ 终于 $z_2 = z(b)$. 若存在 C 上的解析函数 $F(z)$ 使得 $F'(z) = f(z)$, 则

$$\begin{aligned}\int_C f(z) \, dz &= \int_a^b f[z(t)] z'(t) \, dt \\ &= F[z(t)] \Big|_a^b = F(z_2) - F(z_1).\end{aligned}$$

这就是**牛顿-莱布尼兹公式**. 我们把 $F(z)$ 称为 $f(z)$ 的一个**原函数**. 特别地, 若 C 是闭路, 则 $\oint_C f(z) dz = 0$.

例如对于整数 $n \neq 0$, 当 a 在闭路 C 的内部时,

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)^{n+1}}$$

在 C 上有原函数 $F(z) = -\frac{1}{n(z-a)^n}$. 从而 $\oint_C f(z) dz = 0$. 于是我们再次证明了该积分结论的 $n \neq 0$ 情形.

但需要注意 $\frac{1}{z-a}$ 在 C 上并没有原函数, 因为 $\ln(z-a)$ 在 C 上有奇点.

不过, 不同于单变量实函数的情形, 并不是所有的连续函数都有原函数.

设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, C 是 D 内一条起于 z_0 终于 z 的曲线. 由柯西-古萨定理可知, 积分 $\int_C f(\zeta) d\zeta$ 与路径无关, 只与 z_0, z 有关. 因此我们也将记为

$$\int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta.$$

定理. 固定 $z_0 \in D$, 则函数

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) \, d\zeta.$$

是 D 内的解析函数, 且 $F'(z) = f(z)$.

由此可知, 单连通区域上的解析函数总有原函数.

$$\begin{aligned} F(z + \Delta z) - F(z) &= \int_{z_0}^{z+\Delta z} f(\zeta) \, d\zeta - \int_{z_0}^z f(\zeta) \, d\zeta \\ &= \int_z^{z+\Delta z} f(\zeta) \, d\zeta. \end{aligned}$$
$$\int_z^{z+\Delta z} f(z) \, d\zeta = f(z) \int_z^{z+\Delta z} d\zeta = f(z) \Delta z.$$

A diagram illustrating a path in the complex plane. A blue circle is centered at a point labeled z . A purple curve starts at a point labeled z_0 above the circle, passes through the point z inside the circle, and ends at a point labeled $z + \Delta z$ below the circle. The point z is marked with a purple dot and labeled. The point z_0 is also marked with a purple dot and labeled. The point $z + \Delta z$ is marked with a purple dot and labeled. The curve is purple and smooth.

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| &= \left| \int_z^{z+\Delta z} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\Delta z} \, d\zeta \right| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{|\Delta z|} \cdot |\Delta z| = \varepsilon. \end{aligned}$$
$$f(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = F'(z).$$


积分计算方法 II: 原函数法. 设 $f(z)$ 在单连通区域 D 上解析, z_1 至 z_2 的积分路径落在 D 内, 则

$$\int_{z_1}^{z_2} f(z) \, dz = F(z) \Big|_{z_1}^{z_2} = F(z_2) - F(z_1),$$

其中 $F(z)$ 是 $f(z)$ 的一个原函数.

由于导函数为 0 的函数只能是常值函数, 因此

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(z) \, dz + C.$$

我们称之为 $f(z)$ 的**不定积分**, 记为 $\int f(z) dz$.

复变函数和实变函数的牛顿-莱布尼兹定理的差异在哪呢？复变情形要求是单连通区域上解析函数，实变情形要求是闭区间上连续函数。

典型例题: 利用原函数求积分

例. 求 $\int_{z_0}^{z_1} z \, dz$.

解. 由于 $f(z) = z$ 处处解析, 且 $\int z \, dz = \frac{1}{2}z^2 + C$, 因此

$$\int_{z_0}^{z_1} z \, dz = \frac{1}{2}z^2 \Big|_{z_0}^{z_1} = \frac{1}{2}(z_1^2 - z_0^2).$$

因此之前的例子中 $\int_0^{3+4i} z \, dz = -\frac{7}{2} + 12i$, 无论从 0 到 $3 + 4i$ 的路径如何.

典型例题：利用原函数求积分

例. 求 $\int_0^{\pi i} z \cos z^2 dz$.

解. 由于 $f(z) = z \cos z^2$ 处处解析, 且

$$\int z \cos z^2 \, dz = \frac{1}{2} \int \cos z^2 \, dz^2 = \frac{1}{2} \sin z^2 + C,$$

因此

$$\int_0^{\pi i} z \cos z^2 \, dz = \frac{1}{2} \sin z^2 \Big|_0^{\pi i} = -\frac{1}{2} \sin \pi^2.$$

这里我们使用了凑微分法.

典型例题：利用原函数求积分

例. 求 $\int_0^i z \cos z \, dz$.

解. 由于 $f(z) = z \cos z$ 处处解析, 且

$$\int z \cos z \, dz = \int z \, d(\sin z) = z \sin z - \int \sin z \, dz = z \sin z + \cos z + C,$$

因此


$$\int_0^i z \cos z \, dz = (z \sin z + \cos z) \Big|_0^i = i \sin i + \cos i - 1 = e^{-1} - 1.$$

这里我们使用了分部积分法.

练习. 求 $\int_0^1 z \sin z \, dz = \underline{\sin 1 - \cos 1}$.

典型例题：利用原函数求积分

例. 求 $\int_C (2z^2 + 8z + 1) dz$, 其中 C 是摆线 $\begin{cases} x = a(\theta - \sin \theta), \\ y = a(1 - \cos \theta), \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$



解. 由于 $f(z) = 2z^2 + 8z + 1$ 处处解析, 因此

$$\begin{aligned}\text{原积分} &= \int_0^{2\pi a} (2z^2 + 8z + 1) \mathrm{d}z \\ &= \left(\frac{2}{3}z^3 + 4z^2 + z \right) \Big|_0^{2\pi a} = \frac{16}{3}\pi^3 a^3 + 16\pi^2 a^2 + 2\pi a.\end{aligned}$$

典型例题：利用原函数求积分

例. 设 C 为沿着 $|z|=1$ 从 1 到 i 的逆时针圆弧, 求 $\int_C \frac{\ln(z+1)}{z+1} dz$.

解. 函数 $f(z) = \frac{\ln(z+1)}{z+1}$ 在单连通区域 $\operatorname{Re} z > -1$ 内解析.

$$\int \frac{\ln(z+1)}{z+1} dz = \int \ln(z+1) d[\ln(z+1)] = \frac{1}{2} \ln^2(z+1) + C.$$

因此

$$\begin{aligned}\int_C \frac{\ln(z+1)}{z+1} dz &= \frac{1}{2} \ln^2(z+1)|_1^i = \frac{1}{2} [\ln^2(1+i) - \ln^2 2] \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\ln \sqrt{2} + \frac{\pi}{4} i \right)^2 - \ln^2 2 \right] = -\frac{\pi^2}{32} - \frac{3}{8} \ln^2 2 + \frac{\pi \ln 2}{8} i.\end{aligned}$$

第三节 柯西积分公式

- 柯西积分公式
- 高阶导数的柯西积分公式

柯西-古萨定理是解析函数理论的基础,但在很多情形下它由柯西积分公式表现.

柯西积分公式. 设

- 函数 $f(z)$ 在闭路 C 及其内部 D 解析,
- $z_0 \in D$,

则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

若 $z_0 \notin \overline{D}$, 由柯西-古萨定理, 右侧的积分是 0.

解析函数可以用一个积分

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad z \in D$$

来表示, 这是研究解析函数理论的强有力工具.

解析函数在闭路 C 内部的取值完全由它在 C 上的值所确定. 这也是解析函数的特征之一. 特别地, 解析函数在圆心处的值等于它在圆周上的平均值. 设 $z = z_0 + Re^{i\theta}$, 则 $dz = iRe^{i\theta} d\theta$,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta.$$

设 $\Gamma: |z - z_0| = \delta$, 则

$$= \left| \oint_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - \oint_{\Gamma} \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz \right|$$

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0).$$


典型例题: 柯西积分公式的应用

可以看出, 当被积函数分子解析而分母形如 $z - z_0$ 时, 绕闭路的积分可以使用柯西积分公式计算.

例. 求 $\oint_{|z|=4} \frac{\sin z}{z} dz$.

解. 函数 $\sin z$ 处处解析. 取 $f(z) = \sin z, z_0 = 0$ 并应用柯西积分公式得

$$\oint_{|z|=4} \frac{\sin z}{z} dz = 2\pi i \sin z|_{z=0} = 0.$$

典型例题：柯西积分公式的应用

例. 求 $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z-1} dz$.

解. 由于函数 e^z 处处解析, 取 $f(z) = e^z, z_0 = 1$ 并应用柯西积分公式得

$$\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z-1} dz = 2\pi i e^z|_{z=1} = 2\pi i e.$$

练习. 求 $\oint_{|z|=2\pi} \frac{\cos z}{z - \pi} dz = \underline{-2\pi i}$.

典型例题: 柯西积分公式的应用

例. 设 $f(z) = \oint_{|\zeta|=\sqrt{3}} \frac{3\zeta^2 + 7\zeta + 1}{\zeta - z} d\zeta$, 求 $f'(1+i)$.

解. 当 $|z| < \sqrt{3}$ 时, 由柯西积分公式得

$$f(z) = \oint_{|\zeta|=\sqrt{3}} \frac{3\zeta^2 + 7\zeta + 1}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i(3\zeta^2 + 7\zeta + 1)|_{\zeta=z} = 2\pi i(3z^2 + 7z + 1).$$

因此 $f'(z) = 2\pi i(6z + 7)$,

$$f'(1+i) = 2\pi i(13 + 6i) = -12\pi + 26\pi i.$$


注意当 $|z| > \sqrt{3}$ 时, $f(z) \equiv 0$.

典型例题：柯西积分公式的应用

例. 求 $\oint_{|z|=3} \frac{e^z}{z(z^2-1)} dz$.

解. 被积函数的奇点为 $0, \pm 1$. 设 C_1, C_2, C_3 分别为绕 $0, 1, -1$ 的分离圆周. 由复合闭路定理和柯西积分公式

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=3} \frac{e^z}{z(z^2-1)} dz &= \oint_{C_1+C_2+C_3} \frac{e^z}{z(z^2-1)} dz \\ &= 2\pi i \left[\frac{e^z}{z^2-1} \Big|_{z=0} + \frac{e^z}{z(z+1)} \Big|_{z=1} + \frac{e^z}{z(z-1)} \Big|_{z=-1} \right] \\ &= 2\pi i \left(-1 + \frac{e}{2} + \frac{e^{-1}}{2} \right) = \pi i (e + e^{-1} - 2). \end{aligned}$$



高阶导数的柯西积分公式

解析函数可以由它的积分所表示. 不仅如此, 通过积分表示, 还可以说明解析函数是任意阶可导的.

柯西积分公式. 设函数 $f(z)$ 在闭路 C 及其内部 D 解析, 则对任意 $z_0 \in D$,

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

假如 $f(z)$ 有泰勒展开

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n + \cdots$$

那么由 $\oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n}$ 的性质可知上述公式右侧应当为 $f^{(n)}(z_0)$.

两式相减得到

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz, \quad f(z_0 + h) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0 - h} dz.$$

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)(z - z_0 - h)} dz.$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, 左边的极限是 $f'(z_0)$. 因此我们只需要证明右边的极限等于

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz.$$

由于 $f(z)$ 在 C 上连续, 故存在 M 使得 $|f(z)| \leq M$. 注意到 $z \in C$ 时, $|z - z_0| = \delta$, $|z - z_0 - h| \geq \delta - |h|$. 由长大不等式,

其中 L 是闭路 C 的长度. 当 $h \rightarrow 0$ 时, 它的极限为 0, 因此 $n = 1$ 情形得证.

对于一般的 n , 我们通过归纳法将 $f^{(n)}(z_0)$ 和 $f^{(n)}(z_0 + h)$ 表达为积分形式. 比较 $\frac{f^{(n)}(z_0 + h) - f^{(n)}(z_0)}{h}$ 与积分公式右侧之差, 并利用长大不等式证明 $h \rightarrow 0$ 时, 差趋于零. 具体过程见教材. □

典型例题: 使用高阶导数的柯西积分公式计算积分

柯西积分公式不是用来计算高阶导数的, 而是用高阶导数来计算积分的.

例. 求 $\oint_{|z|=2} \frac{\cos(\pi z)}{(z-1)^5} dz$.

解. 由于 $\cos(\pi z)$ 处处解析, 因此由柯西积分公式,

$$\oint_{|z|=2} \frac{\cos(\pi z)}{(z-1)^5} dz = \frac{2\pi i}{4!} \cos(\pi z)^{(4)} \Big|_{z=1} = \frac{2\pi i}{24} \cdot \pi^4 \cos \pi = -\frac{\pi^5 i}{12}.$$

典型例题: 使用高阶导数的柯西积分公式计算积分

例. 求 $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz$.

解. 被积函数在 $|z| < 2$ 的奇点为 $z = \pm i$. 取 C_1, C_2 为以 $i, -i$ 为圆心的分离圆周.

$$\oint_{C_1} \frac{e^z}{(z^2 + 1)^2} dz = \frac{2\pi i}{1} \left[\frac{e^z}{(z + i)^2} \right]' \Big|_{z=i} = 2\pi i \left[\frac{e^z}{(z + i)^2} - \frac{2e^z}{(z + i)^3} \right] \Big|_{z=i} = \frac{(1 - i)e^i \pi}{2}.$$

类似地, $\oint_{C_2} \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz = \frac{-(1+i)e^{-i}\pi}{2}$. 故

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=2} \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz &= \left(\oint_{C_1} + \oint_{C_2} \right) \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz \\ &= \frac{(1-i)e^{i\pi}}{2} + \frac{-(1+i)e^{-i\pi}}{2} = \pi i(\sin 1 - \cos 1). \end{aligned}$$

典型例题: 使用高阶导数的柯西积分公式计算积分

例. 求 $\oint_{|z|=1} z^n e^z dz$, 其中 n 是整数.

解.

(1) 当 $n \geqslant 0$ 时, $z^n e^z$ 处处解析. 由柯西-古萨定理,

$$\oint_{|z|=1} z^n e^z \, dz = 0.$$

(2) 当 $n \leq -1$ 时, e^z 处处解析. 由柯西积分公式,

$$\oint_{|z|=1} z^n e^z dz = \frac{2\pi i}{(-n-1)!} (e^z)^{(-n-1)} \Big|_{z=0} = \frac{2\pi i}{(-n-1)!}.$$

典型例题: 使用高阶导数的柯西积分公式计算积分

例. 求 $\oint_{|z-3|=2} \frac{1}{(z-2)^2 z^3} dz$ 和 $\oint_{|z-1|=3} \frac{1}{(z-2)^2 z^3} dz$.

解.

(1) $\frac{1}{(z-2)^2 z^3}$ 在 $|z-3| < 2$ 的奇点为 $z=2$. 由柯西积分公式,

$$\oint_{|z-3|=2} \frac{1}{(z-2)^2 z^3} dz = \frac{2\pi i}{1!} \left(\frac{1}{z^3} \right)' \Big|_{z=2} = -\frac{3\pi i}{8}.$$

(2) $\frac{1}{(z-2)^2 z^3}$ 在 $|z-1| < 3$ 的奇点为 $z=0, 2$. 取 C_1, C_2 为以 $0, 2$ 为圆心的分离圆周.

$$\begin{aligned} \oint_{|z-1|=3} \frac{1}{(z-2)^2 z^3} dz &= \oint_{C_1} \frac{1}{(z-2)^2 z^3} dz + \oint_{C_2} \frac{1}{(z-2)^2 z^3} dz \\ &= \frac{2\pi i}{2!} \left[\frac{1}{(z-2)^2} \right]'' \Big|_{z=0} + \frac{2\pi i}{1!} \left(\frac{1}{z^3} \right)' \Big|_{z=2} = 0. \end{aligned}$$

练习. $\oint_{|z-2i|=3} \frac{1}{z^2(z-i)} dz = \underline{0}.$

例 (莫累拉定理). 设 $f(z)$ 在区域 D 内连续, 且对于 D 中任意闭路 C 都有 $\oint_C f(z) dz = 0$, 则 $f(z)$ 在 D 内解析.

证明. 由题设可知 $f(z)$ 的积分与路径无关. 固定 $z_0 \in D$, 则

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(z) \, dz$$

定义了 D 内的一个函数. 类似于原函数的证明可知 $F'(z) = f(z)$. 故 $f(z)$ 作为解析函数 $F(z)$ 的导数也是解析的. □

高阶柯西积分公式说明解析函数的导数与实函数的导数有何不同？高阶柯西积分公式说明，函数 $f(z)$ 只要在区域 D 中处处可导，它就一定无限次可导，并且各阶导数仍然在 D 中解析。这一点与实变量函数有本质的区别。

同时我们也可以看出, 若一个二元实函数 $u(x, y)$ 是一个解析函数的实部, 则 u 存在各阶连续偏导数. 这便引出了调和函数的概念.

第四节 解析函数与调和函数的关系

- 调和函数
- 共轭调和函数

调和函数是一类重要的二元实变函数, 它和解析函数有着紧密的联系. 为了简便, 我们用 u_{xx}, u_{yy} 来表示二阶偏导数.

定义. 若二元实变函数 $u(x, y)$ 在区域 D 内有二阶连续偏导数, 且满足拉普拉斯方程

$$\Delta u := u_{xx} + u_{yy} = 0,$$

则称 $u(x, y)$ 是 D 内的调和函数.

定理. 区域 D 内解析函数 $f(z)$ 的实部和虚部都是调和函数.

证明. 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 则 u, v 存在偏导数且

$$f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iu_y.$$

由于 $f(z)$ 任意阶可导, 因此 u, v 存在任意阶偏导数. 由 $C-R$ 方程 $u_x = v_y, u_y = -v_x$ 可知

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0,$$

$$\Delta v = v_{xx} + v_{yy} = -u_{yx} + u_{xy} = 0.$$



反过来, 调和函数是否一定是某个解析函数的实部或虚部呢? 对于单连通的情形, 答案是肯定的.

若 $u + iv$ 是区域 D 内的解析函数, 则我们称 v 是 u 的**共轭调和函数**. 换言之 $u_x = v_y, u_y = -v_x$. 显然 $-u$ 是 v 的共轭调和函数.

定理. 设 $u(x, y)$ 是单连通区域 D 内的调和函数, 则线积分

$$v(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (-u_y dx + u_x dy) + C$$

是 u 的共轭调和函数.

由此可知, 区域 D 上的调和函数在 $z \in D$ 的一个邻域内是一解析函数的实部, 从而在该邻域内具有任意阶连续偏导数. 而 z 的任取的, 因此**调和函数总具有任意阶连续偏导数**.

若 D 是多连通区域, 则未必存在共轭调和函数. 例如 $\ln(x^2 + y^2)$ 是复平面去掉原点上的调和函数, 但它并不是某个解析函数的实部. 事实上, 它是 $2\operatorname{Ln} z$ 的实部.

在实际计算中, 我们一般不用线积分来得到共轭调和函数, 而是采用下述两种办法:

偏积分法. 通过 $v_y = u_x$ 解得 $v = \varphi(x, y) + \psi(x)$, 其中 $\psi(x)$ 待定. 再代入 $u_y = -v_x$ 中解出 $\psi(x)$.

不定积分法. 对 $f'(z) = u_x - \mathrm{i}u_y = v_y + \mathrm{i}v_x$ 求不定积分得到 $f(z)$.

典型例题: 求共轭调和函数和相应的解析函数

例. 证明 $u(x, y) = y^3 - 3x^2y$ 是调和函数, 并求其共轭调和函数以及由它们构成的解析函数.

解. 由 $u_x = -6xy, u_y = 3y^2 - 3x^2$ 可知

$$u_{xx} + u_{yy} = -6y + 6y = 0,$$

故 u 是调和函数.

由 $v_y = u_x = -6xy$ 得 $v = -3xy^2 + \psi(x)$.

由 $v_x = -u_y = 3x^2 - 3y^2$ 得 $\psi'(x) = 3x^2, \psi(x) = x^3 + C$.

故 $v(x, y) = -3xy^2 + x^3 + C$,

$$\begin{aligned} f(z) &= u + iv = y^3 - 3x^2y + i(-3xy^2 + x^3 + C) \\ &= i(x + iy)^3 + iC = i(z^3 + C), C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

典型例题：求共轭调和函数和相应的解析函数

当解析函数 $f(z)$ 是 x, y 的多项式形式时, $f(z)$ 本身一定是 z 的多项式. 于是将 x 全部换成 z , y 全部换成 0 就是 $f(z)$. 即使 $f(z)$ 不是 x, y 的多项式形式, 这种替换方式很多时候也奏效.

在上例中我们也可由另一种方法计算得到:

$$f'(z) = u_x - iu_y = -6xy - i(3y^2 - 3x^2) = 3iz^2.$$

因此 $f(z) = iz^3 + C$.

典型例题：求共轭调和函数和相应的解析函数

例. 求解析函数 $f(z)$ 使得它的虚部为

$$v(x, y) = e^x(y \cos y + x \sin y) + x + y.$$

解. 由 $u_x = v_y = e^x(\cos y - y \sin y + x \cos y) + 1$ 得

$$u = e^x(x \cos y - y \sin y) + x + \psi(y).$$

由 $u_y = -v_x = -e^x(y \cos y + x \sin y + \sin y) - 1$ 得

$$\psi'(y) = -1, \quad \psi(y) = -y + C.$$

故

$$\begin{aligned} f(z) &= u + \mathrm{i}v \\ &= \mathrm{e}^x(x \cos y - y \sin y) + x - y + C + \mathrm{i}[\mathrm{e}^x(y \cos y + x \sin y) + x + y] \\ &= ze^z + (1 + \mathrm{i})z + C, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

也可由

$$\begin{aligned} f'(z) &= v_y + \mathrm{i}v_x \\ &= \mathrm{e}^x(\cos y - y \sin y + x \cos y) + 1 + \mathrm{i}[\mathrm{e}^x(y \cos y + x \sin y + \sin y) + 1] \\ &= (z + 1)\mathrm{e}^z + 1 + \mathrm{i}. \end{aligned}$$

得 $f(z) = ze^z + (1 + i)z + C$.

练习. 证明 $u(x, y) = x^3 - 6x^2y - 3xy^2 + 2y^3$ 是调和函数并求它的共轭调和函数.

答案. $v(x, y) = 2x^3 + 3x^2y - 6xy^2 - y^3 + C.$

显然 $u + \mathrm{i}v = (1 + 2\mathrm{i})z^3 + \mathrm{i}C$.